



ترکیب:

هر کیلوگرم تایلوزین فسفات ۱۰٪ حاوی ۱۰۰ گرم تایلوزین فعال می باشد.

مکانیسم اثر:

تایلوزین آنتی بیوتیکی از دسته ی ماکرولیدها است که با اتصال به تحت واحد ۵۰S ریبوزم از ساخت پروتئین جلوگیری می کند و در نتیجه باعث توقف رشد و انهدام باکتری می شود. مکانیسم خاص اثر ماکرولیدها علاوه بر جلوگیری از رشد سریع میکروارگانیسم ها این می باشد که از ایجاد مقاومت باکتریایی نیز ممانعت می کند.

موارد مصرف:

تایلوزین فسفات فقط در مصارف دامپزشکی کاربرد دارد و به طور عمده بر باکتری های گرم مثبت موثر است ولی بر روی اسپروکت ها و انواعی از باکتری های گرم منفی (کلی فرم ها) نیز تاثیر دارد.

مقدار و نحوه مصرف:

جوجه های گوشتی و پولت های جایگزین تخمگذار: برای درمان بیماری مزمن تنفسی (CRD) ناشی از مایکوپلازما گالی سپتیکوم به میزان ۱۰ کیلوگرم در هر تن خوراک در ۵ روز اول زندگی و در ۳-۵ هفتگی تکرار مصرف به مدت ۲ روز.

تداخل دارویی:

تایلوزین فسفات همزمان با سایر آنتی بیوتیک های مخلوط با دان مصرف نشود.

زمان پرهیز از مصرف:

پنج روز قبل از کشتار

موارد احتیاط:

در هنگام کاربرد و حمل دارو از لباس محافظ، دستکش و ماسک ضد غبار استفاده کنید. دوراز دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، دور از نور مستقیم و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس نگهداری شود.

بسته بندی:

پاکت ۱ و ۵ کیلوگرمی