

داکسی فورت رویان®



ROOYAN
DAROU

Doxyforte®
ROOYAN

پودر قابل حل در آب
Water Soluble Powder

داکسی سایکلین ۵۰٪
Doxycycline 50%

آنتی بیوتیک



همراه داروهایی نظیر تابلوزین، کلیستین و سولفونامیدها به صورت سینرژست به کار برد.

زمان پرهیز از مصرف:

طیور: ۴ روز.

در طیور تخم گذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

تداخل دارویی:

این محصول نباید همزمان با فلورفنیکل، بتلاکتام ها و فرآورده های حاوی کاتیون ها مصرف شود.

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس نگهداری شود.

بسته بندی:

ساشه های ۱۰۰ و ۵۰۰ گرمی

ترکیب:

هر کیلو گرم محصول حاوی ۵۰۰ گرم داکسی سایکلین (هایکلیت) می باشد.

مکانیسم اثر:

داکسی سایکلین متعلق به گروه تتراسایکلین ها می باشد. این آنتی بیوتیک وسیع الطیف بوده و باکتریواستاتیک است. دارای فعالیت ضد میکروبی علیه گونه های مایکو پلاسما، ریکتیزیا، بوردتلا، هموفیلوس پاراگالیناروم، پاستورلامولتوسیدا، اورنیتوباکتریوم راینوتراکتال و E.coli می باشد.

موارد مصرف:

در درمان کلی باسیلوز ناشی از E.coli, CRD ناشی از مایکوپلاسما گالی سپتیکوم، پلی آرتریت ناشی از مایکوپلاسما سینویه در طیور، و بای ناشی از پاستورلامولتو سیدا، ورم روده نکروتیک ناشی از کلستریدیا، سالمونلوزیس، عفونت های استرپتوکوکی، استافیلوکوکی، اورنیتوز و کلامیدوز مصرف این دارو توصیه می گردد.

مقدار و نحوه مصرف:

۴۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده یا ۴۰۰ - ۲۰۰ گرم در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۷ - ۴ روز.

توجه: آب آشامیدنی محتوی داروی مصرفی باید ظرف ۲۴ ساعت استفاده شود.

بنا به نظر دامپزشک می توان داکسی سایکلین را به