



1, 5 & 20 Kg
Premix

فقط برای مصرف دامپزشکی

Robicox®

پیش مخلوط

Robenidine hydrochloride 6.6%

روبیکوکس®

کلستریدیوم پرفرنژنز (عامل اصلی آنتریت نکروتیک) می شود. همچنین بافت اپیتلیال سالم روده ای موجب دریافت بالاترین میزان بازدهی غذایی گشته که منجر به رشد سریعتر و کاهش ضریب تبدیل غذایی می شود.

موارد مصرف:

در طیور گوشتی و بوقلمون مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار و نحوه مصرف:

۵۰۰ گرم در هر تن خوراک جهت به دست آوردن مخلوط یکنواخت با خوراک ابتدا میزان مورد نیاز در ۱۰ کیلوگرم خوراک و سپس به ترتیب در ۱۰۰ و ۱۰۰۰ کیلوگرم خوراک مخلوط نمایید.

زمان پرهیز از مصرف:

۵ روز قبل از کشتار مصرف آن قطع گردد. از مصرف دارو در طیور تخمگذاری که تولید آنها مصرف انسانی دارد، خودداری گردد.

تداخل دارویی:

با انواع ترکیبات جیره و کلیه آنتی بیوتیک ها از جمله تيامولین سازگار است. این دارو نباید هم زمان با سایر ضدکوکسیدوزها مصرف شود.

موارد احتیاط:


دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم نگهداری شود. پس از استفاده درب پاکت را ببندید.

بسته بندی:

ساشه های ۱ و ۵ کیلوگرمی و پاکت ۲۰ کیلوگرمی



روبیکوکس®

روبیدین هیدروکلراید ۶/۶٪ (پیش مخلوط)

ترکیب:

هر کیلوگرم روبیکوکس® حاوی ۶۶ گرم روبیدین هیدروکلراید می باشد.

حیوان هدف: طیور گوشتی و بوقلمون

مکانیسم اثر:

روبیکوکس® یک کوکسیدیوستات شیمیایی می باشد که برخلاف یونوفوره ها در دو مرحله از چرخه زندگی و با مهار تقسیم هسته انگل ایمریا تاثیر خود را می گذارد و بر علیه گونه های مختلف ایمریای بیماریزا در طیور گوشتی شامل ایمریا تنلا، ایمریا نکاتریکس، ایمریا برونٹی، ایمریا آسرولینا، ایمریا ماکزیما و ایمریاهای پاتوژن بوقلمون و خرگوش بسیار موثر است. روبیکوکس® یک ضد کوکسیدیوز ایده آل در برنامه Clean up و به منظور پیشگیری و کنترل کوکسیدیوز به خصوص در زمان آلودگی شدید می باشد. روبیکوکس® در مقایسه با یونوفوره ها کاهش شدید دفع اووسیت را در مدفوع سبب می شود و با سایر ضد کوکسیدیوزها مقاومت متقاطع ندارد. با ممانعت از ایجاد ضایعه در دیواره اپیتلیوم روده علاوه بر افزایش وزن و کاهش ضریب تبدیل غذایی مانع عفونت ثانویه توسط