



پروپیونات سدیم + پروپیونات کلسیم + اکسید منیزیم + سولفات مس
+ سولفات کبالت + کلرید پتاسیم
Sodium propionate + Calcium propionate + Magnesium oxide
+ Copper sulfate + Cobalt sulfate + Potassium chloride



همچنین این دارو به دنبال انجام عمل رومینوتومی کمک زیادی به تحریک فعالیت طبیعی شکمبه می نماید.

مقدار و نحوه مصرف:

یک بسته ۱۰۰ گرمی پودر سوءهاضمه را با مقدار مناسبی آب آشامیدنی (۲ - ۱) لیتر مخلوط کرده و بوسیله بطری یا سوند مخصوص مری به دام خورانده شود.

گاو و شتر: یک بسته ۱۰۰ گرمی در روز
گوسفند و بز: $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{4}$ بسته ۱۰۰ گرمی در روز
در صورت لزوم می توان پس از ۲۴ ساعت درمان را تکرار نمود.

تداخل دارویی:

شناخته نشده است.

موارد احتیاط:

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
در صورت استفاده بر طبق روش توصیه شده، اثرات جانبی ندارد.

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک، دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

ساشه ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ گرمی

ترکیب:

هر کیلو گرم از محصول حاوی:

۴۲۰ گرم	پروپیونات سدیم
۲۶۰ گرم	پروپیونات کلسیم
۱۲۵ گرم	اکسید منیزیم
۰/۷ گرم	سولفات مس
۰/۷۲ گرم	سولفات کبالت
۵ گرم	کلرید پتاسیم

مکانیسم اثر:

این ترکیب به طبیعی نمودن تعادل اسید و باز در محیط شکمبه کمک می نماید. این امر اثر سودمندی بر روی تولید میکروفلور طبیعی شکمبه داشته و از این طریق سبب کمک به عمل هضم سلولز می گردد. این فرآورده حاوی کوفاکتورهای ضروری جهت انجام عمل تخمیر میکروبی در شکمبه (سولفور، کلسیم، منیزیم، کبالت، مس) و ترکیبات قلیایی کننده (اکسید منیزیم) و همچنین محتوی سوبستراهای گلوکوژنیک (سدیم و کلسیم پروپیونات) می باشد.

موارد مصرف:

این دارو برای طبیعی کردن فعالیت شکمبه در ناراحتی های گوارشی اولیه و ثانویه در نشخوارکنندگان کاربرد دارد. این ترکیب جهت درمان اختلالات گوارشی مانند مسمومیت غذایی، ناراحتی های گوارشی ناشی از تغییر شدید رژیم غذایی و اعمال جراحی و در استوئمی اولیه و ثانویه در گاو، گوسفند، بز و شتر مورد استفاده قرار می گیرد.