



50 ml
Injectable solution

فقط برای مصرف دامپزشکی

MEGA FLOR®

Injectable solution

Florfenicol 45%

مگا فلور®

محلول استریل تزریقی

بیشتر از ۱۰ میلی لیتر در ناحیه تزریق نشود.
به منظور اطمینان از تزریق دوز صحیح دارو، وزن بدن دام تا حد امکان درست تخمین زده شود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت در تزریق زیرپوستی (با دوز ۴۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن): ۶۴ روز

گوشت در تزریق عضلانی (با دوز ۲۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن): ۳۷ روز بعد از آخرین تزریق

موارد منع مصرف:

در گاو نر مورد استفاده در تولید مثل، مصرف نشود.

در گاوهای شیروار که شیر آنها مصرف انسانی دارد مصرف نشود.

مصرف فلور فنیکل در حیواناتی که قبلاً به فلور فنیکل افزایش حساسیت نشان داده اند، منع شده است.

عوارض جانبی:

ممکن است کاهش مصرف خوراک و کاهش موقت قوام مدفوع در طول دوره درمان رخ دهد. این علائم بلافاصله پس از قطع درمان بطور کامل بهبود می یابند.

تزریق محصول در حداکثر حجم تزریق در یک محل (۱۰ میلی لیتر) ممکن است باعث بی حسی موضعی موقت و التهاب بالینی قابل مشاهده در محل تزریق گردد. بی حسی موضعی ممکن است برای چندین روز ادامه داشته باشد. تورم محل تزریق به مرور زمان کاهش می یابد که در تزریق زیرپوستی تا ۶۱ روز و در تزریق عضلانی تا ۳۷ روز ممکن است ادامه پیدا کند.

موارد احتیاط:

از تماس دارو با پوست، چشم و لباس ها جلوگیری شود.

در صورت تماس اتفاقی با چشم، به مدت ۱۵ دقیقه با آب بشویید.

در صورت تماس با پوست با آب و صابون شسته شود.

در صورت تزریق ناگهانی به انسان، سریعاً به پزشک مراجعه شود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

اثرات فلور فنیکل روی عملکرد تولید مثلی، آبستنی و شیرواری بررسی نشده است.

شرایط نگهداری:

در دمای اتاق نگهداری شود.

ظرف ۲۸ روز پس از بازکردن ویال، دارو مصرف شود.

بسته بندی:

ویال ۵۰ میلی لیتری



فلور فنیکل ۴۵٪ (محلول استریل تزریقی)

ترکیب:

هر میلی لیتر تزریقی حاوی ۴۵۰ میلی گرم فلور فنیکل می باشد.

حیوان هدف: گاو

مکانیسم اثر:

فلور فنیکل یک آنتی بیوتیک باکتریوستات سنتتیک با طیف اثر گسترده علیه بسیاری از باکتری های گرم منفی و مثبت جدا شده از حیوانات اهلی می باشد. فلور فنیکل با اتصال به تحت واحد ۵S ریبوزوم و جلوگیری از سنتز پروتئین باکتری اثر خود را اعمال می کند. مطالعات آزمایشگاهی نشان داده که فلور فنیکل علیه پاتوژن های ایجاد کننده بیماری تنفسی گاوها (BRD) نظیر مانهیمیا همولیتیکا و هیستوفیلوس سومنی اثر باکتریوسیدی دارد.

موارد مصرف:

فلور فنیکل برای پیشگیری و درمان بیماری تنفسی گاوها (BRD) ناشی از مانهیمیا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا و هیستوفیلوس سومنی استفاده می شود. باید قبل از تجویز جهت پیشگیری، وجود بیماری تنفسی (BRD) در گله تایید گردد.

مقدار و نحوه مصرف:

تزریقی زیر پوستی:

با دوز ۴۰ میلی گرم فلور فنیکل برای هر کیلوگرم وزن بدن که برابر است با ۴ میلی لیتر به ازای هر ۴۵ کیلوگرم وزن بدن بصورت تک دوز توصیه می شود.

تزریق عضلانی:

با دوز ۲۰ میلی گرم فلور فنیکل برای هر کیلو گرم وزن بدن که برابر است با ۲ میلی لیتر به ازای هر ۴۵ کیلو گرم وزن بدن بصورت دو بار تزریق به فاصله ۴۸ ساعت توصیه می شود.

تزریق فقط باید در ناحیه گردن انجام گیرد.