



20 & 50 ml  
Injectable solution

فقط برای مصرف دامپزشکی

# Vitamin B12-1000

Injectable solution

## ویتامین B12-1000

محلول استریل تزریقی

در صورت نیاز ۷ روز دیگر تکرار شود. پس از درمان، سطوح ویتامین B12 در علفخواران باید با مکمل های خوراکی حاوی کبالت حفظ گردد.

**زمان پرهیز از مصرف:**  
ندارد.

**موارد احتیاط:**  
به صورت وریدی مصرف نشود.  
در دام هایی که به هر کدام از ترکیبات دارویی موجود در آن حساس باشند با احتیاط مصرف شود.  
استفاده از سرنگ های استریل و شرایط استریل هنگام تزریق ضروری می باشد.  
در صورت مصرف صحیح دارو هیچگونه عوارض نامطلوبی ایجاد نمی شود.  
در صورت خوراندن یا تزریق اتفاقی به انسان سریعاً با پزشک مشاوره گردد.  
در صورت تماس با چشم و پوست محل تماس با آب سرد شستشو شود.  
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

**شرایط نگهداری:**  
در جای خشک و در حرارت پایین تر از ۲۵ درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.

**بسته بندی:**  
ویال های ۲۰ و ۵۰ میلی لیتری



**ویتامین B12-1000 (محلول استریل تزریقی)**

**ترکیب:**

هر میلی لیتر از محصول حاوی ۱۰۰۰ میکروگرم سیانوکوبالامین می باشد.

**حیوان هدف:**

گاو، اسب، گوساله و کره اسب

**مکانیسم اثر:**

سیانو کوبالامین (ویتامین B12) یک ویتامین محلول در آب و حاوی کبالت است که نقش مهمی در حفظ سلول های عصبی سالم و تولید DNA و RNA دارد. همچنین یکی از عوامل اصلی در تولید گلبول های قرمز خون می باشد.

**موارد مصرف:**

کمک به بالا بردن سطح ویتامین B12 در گاو، اسب، گوساله و کره اسب

برای استفاده در درمان کمبود ویتامین B12 و برای موارد نرخ رشد ضعیف و عدم رشد عمومی مرتبط با کمبود این ویتامین در حیوانات جوان

**مقدار و نحوه مصرف:**

تزریق به صورت زیر جلدی یا داخل عضلانی به شرح زیر می باشد:

**اسب و گاو:** ۱ تا ۳ میلی لیتر

**کره اسب و گوساله:** ۰/۵ تا ۱ میلی لیتر