

**ترکیب:**

هر کیلوگرم کلوپی‌دول ۲۵٪ حاوی ۲۵۰ گرم کلوپی‌دول می‌باشد.

مکانیسم اثر:

کلوپی‌دول با نام علمی ۳ و ۵ دی کلرو - ۲ و ۶ دی متیل - ۴ پیریدینول، یک مشتق پیریدونی ویک کوکسی‌دیواستات شیمیایی می‌باشد.

موارد مصرف:

کلوپی‌دول ۲۵٪ برای کنترل و پیشگیری از کوکسی‌دیوز در نیمچه‌های گوشتی برای تمام دوره پرورش و در نیمچه‌های تخمگذار و بوقلمون‌های پرواری مصرف می‌شود.

این دارو بر روی کلیه گونه‌های بیماریزای ایمریای طیور و بوقلمون مثل: E. meleagrititis, E. praecox, E. maxima, E. necatrix, E. brunetti, E. tenella, E. acervulina, اثر دارد.

مقدار و نحوه مصرف:

نیمچه‌های گوشتی، پولت‌های جایگزین تخمگذار و بوقلمون‌های پرواری:

۱۲۵ یا ۵۰۰ گرم از محصول در یک تن دان آماده به طور مداوم باید مصرف شود.

زمان پرهیز از مصرف:

در طیور ۵ روز قبل از کشتار از جیره حذف شود. در کبک و قراقل ۷ روز قبل از کشتار حذف شود. در نیمچه‌های تخمگذار و بوقلمون از ۱۶ هفتهگی به بعد مصرف نشود.

در مرغ تخمگذار منع مصرف دارد.

تداخل دارویی:

مصرف همزمان دارو با سایر داروهای ضد کوکسی‌دیوز، منع شده است.

موارد احتیاط:

این دارو نباید با سایر کوکسی‌دیواستات‌ها مخلوط شود. قبل از مصرف، کاملاً با دان مخلوط شود. بهترین روش، مخلوط کردن آن به مقدار لازم با ۱۰-۵ برابر وزن خودش با دان و سپس اضافه کردن به کل دان می‌باشد.

در هنگام مخلوط کردن و کاربرد دارو از لباس و دستکش‌های محافظ و ماسک ضدغبار استفاده نمایید چون باعث تحریک و ایجاد حساسیت شدید در چشم می‌شود.

در صورت ورود تصادفی دارو به چشم سریعاً محل تماس را با آب فراوان شستشو دهید.

از تماس دارو با پوست اکیداً خودداری نمایید. بعد از اتمام کار در کیسه را محکم ببندید.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، زیر ۲۵ درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم نگهداری شود.

بسته بندی:

پاکت‌های ۱ و ۵ کیلوگرمی