

کلی استاپ ۱۰ رویان® (پمپ)

Coli STOP 10® (Pump)
ROOYAN



ROOYAN
DAROU

محلول خوراکی
Oral Solution

کلیستین (سولفات) ۲/۰۰۰/۰۰۰ واحد بین المللی
Colistin (sulfate) 2,000,000 IU

آنتی بیوتیک



۰/۳۵ میلی لیتر محلول کلی استاپ ۱۰ رویان® در هر لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ روز
گوساله و بره: ۵۰۰۰۰ واحد به ازای هر کیلوگرم در هر ۱۲ ساعت در آب آشامیدنی یا مخلوط با غذای تکمیلی دوران شیرخوارگی معادل با ۰/۲۵ میلی لیتر از محلول به ازای ۱۰ کیلوگرم وزن زنده دو بار در روز به مدت ۳-۴ روز متوالی
توجه: هر پاف معادل یک میلی لیتر می باشد.

زمان پرهیز از مصرف:

طیور گوشتی: ۲ روز
گوشت و مازاد کشتارگاهی: ۷ روز

تداخل دارویی:

گزارش نشده است.

موارد احتیاط:

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس، دور از تابش مستقیم نور نگهداری شود. پس از مصرف، درب محصول را بخوبی ببندید.

بسته بندی:

ظروف ۱۰۰ میلی لیتری با پمپ

ترکیب:

هر میلی لیتر از فرآورده حاوی ۲ میلیون واحد بین المللی کلیستین (سولفات) می باشد.

مکانیسم اثر:

کلیستین آنتی بیوتیکی از دسته پلی میکسین ها است. مکانیسم اثر پلی میکسین ها هنوز دقیقاً شناخته نشده است. در هر حال مشخص شده است که با تاثیر روی غشاء باکتری و تغییر در قابلیت نفوذپذیری آن سبب مرگ سریع باکتری می شود. کلی استاپ ۱۰ رویان® برخلاف بسیاری از آنتی بیوتیک ها که فقط در طی رشد باکتری عمل می کنند هم در مرحله فعالیت و هم در مرحله سکون باکتری موثر است. مقاومت در برابر کلی استاپ ۱۰ رویان® به ندرت اتفاق می افتد و کلی استاپ ۱۰ رویان® به دنبال تجویز خوراکی جذب روده ای ندارد.

موارد مصرف:

جهت درمان عفونت های گوارشی ناشی از اشریشیا کلی، سالمونلا و سایر عفونت های به وجود آمده توسط باکتری های حساس به کلی استاپ ۱۰ رویان® در طیور. ضمناً کلی استاپ ۱۰ رویان® را می توان هم زمان با بسیاری از آنتی بیوتیک های دیگر از جمله اریتروماکسین، کلیندامایسین، باسیتراسین و سولفونامیدها به صورت سیزژیست به کار برد.

مقدار و نحوه مصرف:

پرندگان: ۷۵۰۰۰ واحد به ازای هر کیلوگرم در هر روز به مدت ۳ روز در آب آشامیدنی پرندگان برابر با ۰/۱۵ تا